

3. KAKO SE CEPI PROTI OKUŽBAM S HPV IN KDAJ?

Cepljenje proti okužbam s HPV se izvaja ob sistematičnem pregledu v 6. razredu osnovne šole, ko deklice prejmejo prvi odmerek cepiva. Raziskave kažejo, da sta za zaščito pri tej starosti dovolj dva odmerka cepiva, med katerima mora miniti najmanj 6 mesecev.

Drugi odmerek deklice prejmejo po dogovoru s šolskim zdravnikom. Dodatni poživitveni odmerki cepiva zaenkrat niso predvideni. Cepljenje proti okužbam s HPV se lahko opravi istočasno z drugimi cepljenji.

Cepljenje je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV, torej pred prvimi spolnimi stiki. Cepivo ne zdravi že obstoječe okužbe s HPV in njenih zapletov.

4. KDAJ SE NE SME CEPITI PROTI OKUŽBAM S HPV?

Proti okužbam s HPV se ne sme cepiti deklica, ki je kdaj imela hudo alergično reakcijo na sestavine cepiva.

Cepljenje je treba odložiti pri deklicah, ki imajo hujšo akutno bolezen z zvišano telesno temperaturo.

5. ALI JE CEPLJENJE PROTI OKUŽBAM S HPV VARNO?


Cepljenje proti okužbam s HPV je zelo varno. Lahko se pojavijo neželeni učinki, ki pa so običajno blagi in prehodni. Najpogosteje so to lokalne reakcije na mestu cepljenja (bolečina, rdečina, oteklina), utrujenost, slabost in glavobol. Resnejši neželeni učinki so zelo redki.

Več informacij o cepljenju proti okužbi s HPV lahko dobite pri šolskem zdravniku ali na spletni strani NIJZ:

<http://www.nijz.si/sl/najpogostejša-vprasanja-in-odgovori-o-okuzbi-s-hpv-raku-maternicnega-vratu-in-cepljenju-proti-hpv-1>



Svetovna zdravstvena organizacija redno spremlja podatke o neželenih učinkih v številnih državah po svetu in ugotavlja, da je cepivo varno.



in cepljenje

Pomembne informacije za starše in izjava



Vsaj polovica ljudi, ki so spolno aktivni, se v življenju okuži s HPV.

1. KAJ JE HPV?

Okužbe s humanimi papilomavirusi (HPV) so ene najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi v Sloveniji.

Okužene osebe večinoma nimajo bolezenskih znakov. Pri večini okužba spontano mine, pri nekaterih pa se lahko razvije trajna okužba. Po trajni okužbi z visokorizičnimi genotipi HPV se lahko pojavijo predrakave spremembe in rak materničnega vratu ter nekateri drugi raki, po okužbi z nizkorizičnimi genotipi pa genitalne bradavice.

Zdravljenje bolezni, ki nastanejo kot posledica teh okužb, je dolgotrajno in ni vedno uspešno.

V Sloveniji je rak materničnega vratu še vedno pomemben javno-zdravstveni problem, kljub zelo učinkovitemu državnemu programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (ZORA). Zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu pri nas vsako leto opravijo kirurške posege pri več kot 3000 ženskah.

Več kot 99 % raka materničnega vratu nastane kot posledica trajne okužbe z enim izmed visokorizičnih genotipov HPV.

Po podatkih Registra raka z Onkološkega inštituta v Sloveniji za rakom materničnega vratu vsako leto na novo zbolijo okrog 120 žensk, 30 do 40 pa jih je zaradi te bolezni umre.

2. CEPIVO PROTI OKUŽBAM S HPV - ZAKAJ JE POMEMBNO?

Cepivi, ki sta v Sloveniji na voljo za cepljenje proti okužbam s HPV sta inaktivirani (mrtvi) cepivi, ki zelo učinkovito preprečita okužbo z najpogostejšimi visokorizičnimi genotipi, ki povzročajo raka materničnega vratu in nekatere druge rake. Cepivo, ki se uporablja za izvajanje Programa cepljenja v Sloveniji, ščiti tudi proti genitalnim bradavicam.

Tako pri necepljenih, kot tudi pri cepljenih dekletih so potrebni redni ginekološki pregledi, saj cepljenje ne ščiti pred vsemi rakotvornimi HPV.

Zaščita po cepljenju je dolgotrajna.



Izjava o cepljenju proti okužbam s HPV (se hrani v zdravstvenem kartonu)

Spodaj podpisani/a _____, zakoniti zastopnik/ca deklice:
Ime in priimek _____, rojene _____

SOGLAŠAM s cepljenjem _____ NE SOGLAŠAM s cepljenjem
(ustrezno obkrožite)

Datum: _____ Podpis zakonitega zastopnika: _____

V kolikor soglašate s cepljenjem vaše deklice proti HPV, vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali vaša deklica trenutno preboleva kakšno bolezen? Katero?	NE DA _____
Ali jemlje kakšna zdravila? Katera?	NE DA _____
Ali je imela kdaj hujšo alergijo na hrano? Na katero?	NE DA _____
Ali je imela kdaj hujšo alergijo na zdravila? Na katera?	NE DA _____
Ali je imela kdaj hujšo reakcijo po cepljenju? Po katerem?	NE DA _____
Ali nam želite še kaj sporočiti?	NE DA _____